

CHẤN THƯƠNG

Em bé có thể bị thương trong khi sinh, đặc biệt nếu quá trình chuyển dạ kéo dài hoặc khi em bé quá lớn. Một số hình thái tổn thương thường gặp như:

Đầu bị kéo dài: tình trạng này xảy ra trong sinh thường do áp lực các con co tử cung gây ra lên hộp sọ trẻ sơ sinh khi nó đi qua ống đẻ. Tình trạng này chưa thực sự là một chấn thương và thường *khỏi sau vài ngày*.



Hình ảnh đầu bé bị kéo dài

Trầy xước và tổn thương da đầu: thường ở bề mặt da, có thể xảy ra trong cuộc chuyển dạ có sử dụng dụng cụ (giác hút, forceps,...), Trừ khi có nhiễm trùng, những vết trầy xước này thường không cần điều trị.

Bướu huyết thanh: là khối dịch dưới da đầu do sự thoát mạch của huyết thanh do áp lực xảy ra trong cuộc chuyển dạ lên đầu trẻ ở những trẻ đẻ ngôi đầu. Hầu hết không cần điều trị, chỉ cần theo dõi diễn tiến khối dịch mà thôi. Đa số bướu huyết thanh sẽ nhỏ dần và khỏi sau vài ngày.

HAI VẤN ĐỀ THƯỜNG GẶP Ở TRẺ NGAY SAU SINH



Hình ảnh bầm máu thanh ở vùng đỉnh đầu bé

Gãy xương đòn và chấn thương đám rối thần kinh cánh tay thường xảy ra trong trường hợp kẹp vai, ngôi ngược. Chấn thương có thể đơn giản hoặc nặng nề cần được bác sĩ chuyên khoa theo dõi và xử trí

BÉ TÍM

Trẻ sau sinh có thể hơi xanh hoặc tím, điều này đa số là bình thường. Nếu do lạnh, chúng sẽ trở lại màu hồng ngay khi được ủ ấm. Đôi khi mắt, lưỡi và môi có thể hơi xanh khi trẻ sơ sinh khóc dữ dội, nhưng khi trẻ bình tĩnh lại, màu sắc của trẻ sẽ nhanh chóng trở lại bình thường. Tuy nhiên, màu da xanh dai dẳng là dấu hiệu tim hoặc phổi không hoạt động bình thường và em bé không nhận đủ oxy trong máu.

HAI VẤN ĐỀ THƯỜNG GẶP Ở TRẺ NGAY SAU SINH



Hình ảnh bé tím (trái) và bé hồng hào (phải)

*Nguồn tham khảo: 11 Common Conditions in Newborns. (2021, March 12).
Healthychildren.org.*

<https://www.healthychildren.org/English/ages-stages/baby/Pages/Common-Conditions-in-Newborns.asp>

KHOA SẢN-CẤP CỨU